



FAUNE DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA GRANDE SASSIÈRE



Copyright: Of Mountains and Marmots Project



AMPHIBIEN

Fiche Espèce:

GRENOUILLE ROUSSE/GRASS FROG

Rana temporaria

Famille : Ranidae

Répartition:

Cette espèce d'amphibien se rencontre en Europe: du Nord de l'Espagne, du Nord de l'Italie et du Nord de la Grèce jusqu'au Nord de la Scandinavie et à l'Ouest de la Sibérie et au Nord du Kazakhstan jusqu'à 3000 mètres d'altitude.

Habitat:

La Grenouille Rousse se rencontre dans tous les terrains humides : mares, prairies, fossés, tourbières, bords de ruisseau... Elle a un mode de vie essentiellement terrestre, mais ne reste jamais très loin de l'eau dans laquelle elle se reproduit.

Description:

La couleur de cette grenouille varie du roux, brun au gris. Elle est tachetée de noir, particulièrement en montagne et mesure entre 7 et 10 cm.

Comme toutes les grenouilles brunes de la même famille, elle possède une tache temporale brun sombre située juste à côté de l'œil.

Au tout début du printemps, la grenouille rousse pond ses œufs, regroupés en amas compact qui flottent souvent à la surface de l'eau.



REPTILES

Fiche Espèce:

LÉZARD VIVIPARE/COMMON LIZARD

Zootoca vivipara

Famille : Lacertidae

Répartition:

Cette espèce de lézard est répartie sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Cette espèce se rencontre au sol dans des milieux variés, mais non loin de l'eau, tels que les broussailles, les tourbières et les fossés un peu plus pierreux en altitude.

Description:

Adulte, ce lézard ne mesure pas plus de 15 cm de long.

Il arbore une robe brune très variable, parfois complètement noire, parsemée de petits points clairs, les flancs étant quand à eux plus foncés. Une ligne dorsale noire est souvent visible, ainsi que des taches brun foncé régulièrement réparties.

Le mâle, toutefois, a une particularité qui vous évitera de le confondre avec son cousin des murailles : son ventre, notamment l'intérieur de ses cuisses et le dessous de la queue, sont colorés de rouge vermillon ou d'orange vif.



Fiche Espèce:

VIPÈRE ASPIC/ASP VIPER

Vipera aspis

Famille : Viperidae

Répartition:

La vipère aspic n'est présente qu'en Europe de l'Ouest. Elle se rencontre dans le nord-est de l'Espagne, en France, en Suisse, en Italie, dans le sud-ouest de l'Allemagne en Slovénie et en Croatie.

En France, elle est présente partout sauf au nord d'une ligne qui s'étend de la Loire-Atlantique à la Moselle. Cette limite nordique est liée aux conditions climatiques défavorable à l'espèce. Puisque cette vipère requiert une température suffisante pour terminer son cycle de reproduction avant d'entrer en hibernation.

Habitat:

Cette espèce se rencontre dans une grande variété d'habitats, principalement dans les écotones qui correspondent aux zones de transition entre deux types de milieux. Cependant, elle fréquente plutôt les terrains accidentés en milieu secs tels que les coteaux rocheux embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les murs de pierres sèches.

Description:

Comme toutes les vipères, elle possède des pupilles verticales.

Son corps est épais et sa tête est large et triangulaire.

Les écailles du corps montrent une arête longitudinale médiane (on dit qu'elles sont carénées). Le dessin des marques dorsales est variable mais forme souvent en France un motif de bandes transversales foncées pouvant devenir une bande en zig-zag brun foncé ou noire dans le sud-ouest. Adulte, cette vipère mesure entre 50 et 70 cm de long, mais peut parfois atteindre les 90 cm.



MAMMIFÈRES

Fiche Espèce:

BOUQUETIN DES ALPES/IBEX

Capra ibex

Famille : Bovidea

Répartition:

Comme son nom l'indique, cette espèce se rencontre uniquement dans l'arc alpin.

Habitat:

Le bouquetin fréquente principalement les milieux de haute montagne. Mais selon les saisons l'altitude à laquelle il est possible de l'observer varie entre 500 et 3000 mètres.

Description:

Cette espèce s'apparente à une chèvre.

Le mâle, aussi appelé bouc, mesure entre 75 et 90 cm au garrot pour une longueur, du museau à la queue, comprise entre 140 et 160 cm.

La femelle, appelée étagne, est plus petite et plus fine que le mâle. Elle mesure entre 70 et 78 cm de hauteur au garrot pour une longueur comprise entre 105 et 145 cm. Son poids varie entre 35 et 50 kg.

Dès l'âge de 3 mois, la tête du mâle s'orne de cornes persistantes, recourbées vers l'arrière. Elles grandissent toute la vie et peuvent atteindre 1 mètre de long.

Les femelles sont également pourvues de cornes, mais plus petites, pouvant atteindre 30 cm au maximum.

Leur pelage varie du beige au marron foncé selon le sexe de l'animal.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

CHAMOIS/ALPINE CHAMOIS

Rupicapra rupicapra

Famille : Bovidés

Répartition:

En France, le chamois se rencontre dans les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées.

Habitat:

Le chamois se rencontre dans les zones rocheuses, les forêts et les pâturages de montagne jusqu'à 3500 mètres selon la saison.

Description:

Le Chamois possède une silhouette de chèvre, mais plus svelte.

Il mesure de 120 à 130 cm de longueur, avec une queue de 7 à 8 cm. Sa hauteur varie entre 70 et 80 cm et il peut peser entre 35 et 60kg.

Il est reconnaissable à sa tête bicolore. Son front et ses joues sont blancs séparés par une bande noire, des oreilles au museau.

Son pelage d'été est brun roussâtre clair avec une raie dorsale brun foncé. En hiver, son pelage est brun noir, plus épais et plus long, avec un masque facial plus net.

Les mâles ont une crinière dorsale, la « barbe ».

Chez les deux sexes, les cornes sont fines, verticales, en crochet à l'extrémité, plus épaisses chez les mâles que chez les femelles.



Pelage d'été



Pelage d'hiver

Fiche Espèce:

LOUP D'EUROPE/EUROPEAN WOLF

Canis lupus

Famille : Canidae

Répartition:

En France, il fréquente les zones de montagne comme les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées orientales.

Habitat:

Il fréquente les zones forestières et les zones montagneuses où se reproduisent ses proies tels que les chevreuils, les chamois...

Description:

Morphologiquement, le loup ressemble à un chien, ce qui rend l'identification difficile surtout lorsque les observations sont furtives.

Son pelage est à dominante grise, le devant des pattes antérieures noir et un masque facial blanc.

L'avant-train du loup est plus puissant que le chien, la poitrine plus profonde et la tête plus large et son allure est celle d'un animal « haut sur patte ».



Fiche Espèce:

RENARD ROUX/RED FOX

Vulpes vulpes

Famille : Canidae

Répartition:

Le renard se rencontre sur la totalité des pays européens.

Habitat:

Bien qu'il se trouve en plus forte concentration dans les zones agricoles, le renard roux occupe des milieux variés que se soit en campagne, en forêt, à la montagne ou en ville.

Description:

Le renard roux ressemble plus ou moins à un chien avec un corps allongé et de courtes pattes pour une queue très touffue. Ses oreilles mesurant 8 à 15 cm de long sont pointues et son museau est particulièrement allongé. Il est généralement d'un roux vif avec le bout de la queue, la gorge et le ventre blanc. Cependant il n'est pas rare de voir des individus noir foncé, totalement bruns ou partiellement beiges.

Il mesure environ 40 cm au garrot.



Fiche Espèce:

CHEVREUIL/ROE DEER

Capreolus capreolus

Famille : Cervidae

Répartition:

Le chevreuil est présent dans tous les départements français sauf la Corse.

Habitat:

Son habitat est très variable suivant les régions, il fréquente les milieux cultivés, les milieux forestiers, les plaines, les bocages et les zones montagnardes, mais reste à proximité des zones boisées.

Description:

C'est un petit animal agile et très rapide, à la robe brunâtre et à la face plutôt grise, qui atteint à l'âge adulte des tailles variant selon les individus, de 62 à 67 cm de hauteur au garrot.

Les mâles portent des bois caducs.



Fiche Espèce:

LÉROT/GARDEN DORMOUSE

Eliomys quercinus

Famille : Gliridae

Répartition:

Le renard se rencontre sur la totalité des pays européens.

Habitat:

Son habitat est très varié pour autant qu'il dispose d'abris. Ce petit animal hibernant fréquente les parcs, jardins, haies, milieux boisés. Hiberne éventuellement dans les grottes ou dans les dépendances des maisons.

Description:

Il mesure une quinzaine de centimètres sans la queue et pèse entre 40 et 120 grammes.

Ce petit rongeur est reconnaissable à son masque facial noir.

Son pelage est brun-gris parfois mêlé de roux sur le dos et les flancs brun-gris. Les joues et le ventre sont blancs. Sa queue est longue et très velue, munie à son extrémité de poils plus longs, blancs et noirs formant un plumet terminal.



Fiche Espèce:

LIÈVRE D'EUROPE/BROWN HARE

Lepus europaeus

Famille : Leporidae

Répartition:

Il est présent dans presque toute l'Europe à l'exception du Portugal, du centre et du sud de l'Espagne, de la Sardaigne, de la Sicile et de la Norvège.

Habitat:

Cette espèce de lièvre se rencontre dans les milieux plutôt ouverts, tels que les prairies, les champs cultivés, les haies, les steppes... jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude.

Description:

Il ressemble à un gros lapin, mais plus grand et plus mince. Il possède de plus grandes pattes et de plus grandes oreilles que le lapin de garenne.

Sa taille varie entre 50 et 70 cm de longueur pour un poids de 2,5 à 6,5 kg.

Ses pattes mesurent entre 12 et 15 cm ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de pointes supérieures à 60 km/h. Il a une petite queue légèrement touffue mesurant 7 et 11 cm et de couleur noire sur le dessus et blanc sur le dessous.

Ses oreilles, plus longues que la tête, sont grises avec les pointes noires.

Son pelage est épais et de couleur généralement brun foncé avec la partie ventrale blanche ou beige.



Fiche Espèce:

LIÈVRE VARIABLE/MOUTAIN HARE

Lepus timidus

Famille : Leporidae

Répartition:

En France, le lièvre variable se retrouve exclusivement dans les Alpes.

Habitat:

Cette espèce de lièvre se rencontre uniquement dans les zones de montagne entre 1500 et 3000 mètres d'altitude.

Description:

Son comportement discret et les difficultés d'accès à son milieu de vie font du lièvre variable un animal bien moins connu que son cousin le lièvre d'Europe.

Cependant, comme certaines espèces de montagne, le lièvre variable change de coloration avec les saisons.

Il ressemble beaucoup au lièvre d'Europe, mais il se différencie de celui-ci grâce à ses oreilles plus courtes et à ses pattes arrières très larges qui lui servent de raquette pour se déplacer sur la neige.



Pelage d'été



Pelage d'hiver

Fiche Espèce:

MULOT A COLLIER/YELLOW NECKED MOUSE

Apodemus flavicollis

Famille : Muridae

Répartition:

Il est présent dans toute l'Europe.

Habitat:

Le mulot a collier fréquente tout types de zones boisées.

Description:

Il mesure de 8 à 13 cm avec une queue aussi longue voire plus longue que le corps, pour un poids de 22 à 45 grammes.

Il se distingue des autres mulot par une tache jaune sous et parfois autour du cou.

Son pelage est fauve sur le dos, légèrement mêlé de gris. Le ventre est généralement blanc pur très bien délimité.



Fiche Espèce:

CAMPAGNOL DES NEIGES/EUROPEAN SNOW VOLE

Chionomys nivalis

Famille : Muridae

Répartition:

Il est présent dans les zones montagneuses d'Europe moyenne et méridionale.

Habitat:

Ce campagnol fréquente les zones pierreuses, les éboulis, les forêts claires et les alpages de montagne.

Description:

Il se distingue des autres campagnols par son corps plus allongé que les autres campagnols, sa queue et ses oreilles sont également plus longues. Il se caractérise par un épais pelage gris tirant sur le brun sur le dos et beaucoup plus clair (gris-blanc) sous le ventre.



Fiche Espèce:

CAMPAGNOL ROUSSÂTRE/BANK VOLE

Clethrionomys glaerolus

Famille : Muridae

Répartition:

Il est présent dans toute l'Europe et habite toute la France sauf le pourtour méditerranéen.

Habitat:

Le campagnol roussâtre vit principalement dans les régions boisées denses, les bosquets, les ronciers et les fougères. Son habitat est généralement constitué par des parcelles non exploitées, les arbres morts ou les branches cassées laissées sur place avec une épaisse litière.

Description:

Il mesure de 12 à 13 cm avec une queue longue de 3 cm pour un poids entre 35 et 45 grammes. Son pelage est brun roussâtre au-dessus, gris-brun sur les flancs et gris jaunâtre au-dessous.



Fiche Espèce:

CAMPAGNOL AGRESTE/FIELD VOLE

Microtus agrestis

Famille : Muridae

Répartition:

C'est une espèce à répartition eurasiatique.

Habitat:

Il aime les biotopes humides. Les coulées faites entre les touffes de graminées mènent à l'entrée des galeries souvent superficielles. Il aime être protégé par de hautes herbes. On le trouve souvent en prairie, au bord des champs, dans les clairières, les haies, les taillis, les bois clair, les tourbières. Les indices sont les crottes vertes entassées dans les coulées.

Description:

Comme tous les campagnols il possède un corps trapu et un museau arrondi.

Sa longueur varie entre 8,5 et 13 cm comprenant une queue courte de 2,5 à 4 cm de long.

Son pelage est gris-brun sur le dessus et foncé dessous. Le cou et les pieds sont gris blancs parfois teintés de crème. Le pelage est assez long et hirsute, plus doux au toucher que celui du Campagnol Roussâtre. L'intérieur des oreilles est velu. La coloration du pelage et les dimensions restent variables notamment en fonction du milieu.



Fiche Espèce:

FOUINE/BEECH MARTEN

Martes foina

Famille : Mustelidae

Répartition:

En France, elle se rencontre sur l'ensemble du territoire.

Habitat:

Son habitat est très variable suivant les régions, elle peut vivre en pleine nature dans des forêts de feuillus, les lisières de bois, les coteaux rocailleux, les basses montagnes au dessous de 2300 m et tout autre paysage relativement ouvert, mais elle peut également fréquenter les zones habitées comme les petits villages, voire de grosses agglomérations.

Description:

La fouine est un petit mustélidé qui mesure entre 66 et 77 cm de longueur (dont une queue touffue d'environ 25 cm).

Le mâle est plus gros que la femelle, son poids peut atteindre 2,5 kg à l'âge adulte alors que la femelle ne dépasse pas 1,5 kg.

Son pelage est totalement brun à grisâtre à l'exception d'une tache blanche se situant au niveau de la gorge que l'on nomme la bourre. La bourre est souvent divisée en deux parties qui atteignent le haut des pattes antérieures. Sa fourrure est composée de longs poils et ses pieds sont non velus.



Fiche Espèce:

MARTRE DES PINS/WOOD MARTEN

Martes martes

Famille : Mustelidae

Répartition:

La martre est présente dans presque toute l'Europe occidentale jusqu'en Sibérie occidentale.

Habitat:

La martre est inféodée aux milieux forestiers de plaine ou de montagne, qu'il s'agisse de conifères de feuillus ou de forêts mixtes.

Description:

La martre est un mustélidé brun foncé au pelage soyeux et uniforme et au corps allongé et court sur pattes. La queue touffue représente un tiers de la longueur totale.

Elle peut être confondue avec le fouine.

La bavette blanche au niveau s'arrête au niveau de la gorge pour la martre alors qu'elle s'étend aux avant-bras chez la fouine.



Fiche Espèce:

HERMINE/ERMINE

Mustela erminea

Famille : Mustelidae

Répartition:

L'hermine se retrouve sur une bonne partie de l'Europe, excepté dans la partie méditerranéenne ou les températures sont trop chaudes pour cette espèce.

Habitat :

L'hermine fréquente un grand nombre de milieux où se reproduisent ses proies préférées que sont les campagnols, les lapins et les lièvres.

Description:

L'Hermine est mince et souple comme la belette, à qui elle ressemble beaucoup. Elle s'en distingue par sa taille plus grande, sa queue proportionnellement plus longue et toujours noire au bout, et par une ligne de démarcation nette entre le brun-roux du dessus et le blanc du dessous. La longueur totale du corps est, pour le mâle, de 16 à 31cm, avec une queue de 6 à 12cm pour la queue. Le poids d'un mâle varie de 130 à 445 g et celui de la femelle de 130 à 280 g. Son pelage change de couleur en hiver afin de se protéger des prédateurs.



Pelage d'été



Pelage d'hiver

Fiche Espèce:

BELETTE D'EUROPE/COMMON WEASEL

Mustela nivalis

Famille : Mustelidae

Répartition:

L'hermine se retrouve sur une bonne partie de l'Europe ainsi qu'en Amérique du Nord.

Habitat :

La belette fréquente un grand nombre de milieux allant des prairies, aux champs, aux bois, aux plaines, jusqu'aux montagnes, c'est-à-dire partout où il y a des proies et des abris.

Description:

La belette mesure entre 17 et 31 cm pour les mâles et 17 et 20 cm pour les femelles.

Elle peut être confondue avec l'hermine, puisque son pelage est brun sur le dessus et blanc au dessous, mais contrairement à cette dernière le bout de la queue est plus court et ne possède pas de pinceau noir au bout.

De plus la couleur du pelage de la belette est invariable selon les saisons, excepté dans le Nord de l'Europe.



Fiche Espèce:

MUSARAIGNE ALPINE/

Sorex alpinus

Famille : Soricidae

Répartition:

En France, c'est une espèce présente dans les massifs montagneux du Jura et des Alpes.

Habitat:

C'est une espèce présente dans les forêts mixtes ou de résineux au sol garni de blocs moussus, les prairies subalpines humides parsemées de lapiaz et anfractuosités rocheuses.

Description:

Elle se distingue pas une longue queue et un pelage entièrement gris.

