



OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA GRANDE SASSIERE



Copyright: Of Mountains and Marmots Project

Translation from French to English by Ann Diaz, Edited by Barbara Mandula, March 2014.



OISEAUX

Fiche Espèce:

AUTOUR DES PALOMBES/NORTHERN GOSHAWK

Accipiter gentilis

Famille : Accipitridae

Répartition:

L'Autour des palombes niche dans l'extrême nord du Maroc, dans presque toute l'Europe (à l'exception notable de l'Islande), en Turquie, dans le nord et le centre de l'Asie ainsi que dans le nord de l'Amérique du Nord.

Habitat:

L'autour fréquente des milieux variés allant des plaines jusqu'aux régions montagneuses, jusqu'à 1600 mètres d'altitude.

Description:

Redoutable chasseur d'oiseaux, l'autour des palombes est un rapace diurne des régions boisées. Plus grand que l'épervier d'Europe, longue queue assez large.

Mâle : dessus gris, dessous gris pâle strié, sous-caudales blanches, calotte noirâtre noirâtres et sourcil blanc.

Femelle : beaucoup plus grande que le mâle avec une fois et demi son poids. Même description en beaucoup plus terne. Dessus gris brun avec le dessous plus clair.

En vol, il est reconnaissable à ses battements d'ailes rapides, suivi d'une brève glissade.



Comparaison femelle/mâle

Comparaison juvénile/adulte

Fiche Espèce:

ÉPERVIER D'EUROPE/EURASIAN SPARROW HAWK

Accipiter nisus

Famille : Accipitridae

Répartition:

Comme son nom l'indique, il est présent sur l'ensemble de l'Europe jusqu'aux pays scandinaves et la Russie, et même en Asie jusqu'à l'océan Pacifique.

Habitat:

Les éperviers d'Europe préfèrent les contrées où les espaces ouverts alternent avec les boisements de conifères et de feuillus, mais aussi les zones bocagères.

Description:

Les mâles ont approximativement la taille d'un faucon crécerelle mais la femelle est plus grande.

Le mâle a les parties supérieures du corps entièrement gris ardoisé, à l'exception d'une petite zone blanchâtre sur la nuque et au-dessus des yeux. Sa gorge blanchâtre, recouverte de fines stries longitudinales brunes. Le dessous blanc est rayé transversalement de brun roussâtre.

La femelle est nettement plus grande que son partenaire, son dessus est plus brun. Les barres du dessous sont plus brunes que brun-roux. Le dessin de la tête est plus marqué, notamment le sourcil est plus blanc. Les barres sombres du dessous des rémiges sont plus visibles.

En vol, la longue queue est très nettement barrée de gris et de brun foncé.



Comparaison femelle/mâle



Femelle en vol

Fiche Espèce:

AIGLE ROYAL/GOLDEN EAGLE

Aquila chrysaetos

Famille : Accipitridae

Répartition:

L'aigle royal se rencontre dans les montagnes d'Eurasie, comme les Alpes et les Pyrénées, mais aussi en Asie orientale, au Maghreb et en Amérique du Nord.

Habitat:

Il fréquente principalement les milieux montagnards, tels que les pentes avec éboulis aux abords des falaises qu'il utilise pour nicher. Mais se rencontre également dans les milieux ouverts, tels que les plaines, tourbières, etc

Description:

Ses ailes larges, arrondies et une envergure de plus de 2 mètres font de lui un des plus grands rapace du monde. Le plumage sombre uniforme avec des taches blanches aux ailes et à la base de la queue est semblable aux deux sexes.

A l'âge adulte, les plumes qui lui couvrent la nuque sont brun-dorées.

En vol, il sait parfaitement profiter des courants aériens pour planer sans efforts sur des kilomètres, les ailes légèrement coudées en V.



Fiche Espèce:

BUSE VARIABLE/COMMON BUZZARD

Buteo buteo

Famille : Accipitridae

Répartition:


C'est le rapace le plus commun d'Europe centrale. Il est également présent sur une partie de l'Asie.

Habitat:

Elle fréquente une grande variété de milieux, mais reste proche des zones boisées allant des petits bosquets des champs jusqu'aux forêt alluviales.

Description:

Stature compacte, avec une tête rondelette et une queue assez courte. Comme son nom l'indique, plumage aux couleurs très variables, généralement brun foncé avec le dessous tacheté de blanc. Le bec est courbé dès la base. Sexes semblables, la femelle étant un peu plus grande que le mâle.



Fiche Espèce:

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC/SHORT TOED SNAKE-EAGLE

Circus gallicus

Famille : Accipitridae

Répartition:

Ce rapace est réparti sur la partie ouest de l'Europe.

Habitat:

Il fréquente les zones semi-désertiques, les sols couverts de broussailles alternant avec les pierrailles, les paysages de garrigue et de maquis. Mais il peut aussi vivre en moyenne montagne ou dans les milieux de bocage très ouvert, tout dépend de la richesse du milieu en serpents qui demeure le paramètre essentiel qui conditionne sa présence.

Description:

Son plumage est brun uniforme par dessus contrastant avec les parties inférieures qui sont blanches et délicatement mouchetées de brun. Sa tête large et plus sombre apparaît comme disproportionnée par rapport au reste du corps. Son envergure importante lui confère une silhouette massive en vol, reconnaissable entre toutes. Sa tête un peu semblable à celle d'un strigidé et ses iris jaunes sont très caractéristiques. La femelle est un peu plus grande que le mâle.



Fiche Espèce:

GYPAÈTE BARBU/LAMMEGEIER

Gypaetus baratus

Famille : Accipitridae

Répartition:

En France, on le rencontre dans les Alpes, mais aussi en Corse et dans les Pyrénées où il a été réintroduit.

Habitat:

Il fréquente les zones de montagnes situées aux limites supérieures de la forêt, de préférence dans une grotte ou vire surplombée sur falaise escarpée, à proximité ou non de pierriers.


Description:

C'est le plus grand vautour de la faune européenne, puisque son envergure varie de 2,45 à 2,85 mètres, sa longueur varie entre 1 mètre et 1,30 mètre pour un poids allant de 5 à 7 kg.

Les deux sexes sont semblables, avec la femelle plus grande que le mâle. Ses ailes larges et pointues et sa queue cunéiforme le rendent facilement identifiable.

Le gypaète barbu tient son nom des "mèches" de plumes naissant à la base des mandibules, et d'autres qui partent des joues et pendent de chaque côté du bec, en formant une curieuse barbiche noire.

Les yeux sont jaunes, entourés d'un cercle oculaire d'un rouge intense. Le gypaète barbu adulte a la tête couleur crème. Un masque noir entoure ses yeux, et les deux parties du masque se rejoignent sur le haut de la tête, en une fine ligne noire. Les parties supérieures (dos, ailes et queue) sont noirâtres. Les parties inférieures sont jaune rosé avec des tons orangés, et rayées et tachetées de noir sur la gorge et le haut de la poitrine, formant un collier incomplet. Les immatures sont entièrement bruns, avec la tête noirâtre. Ils arborent leur plumage adulte seulement à l'âge de 6 ans.



Fiche Espèce:

VAUTOUR FAUVE/GRIFFON VULTURE

Gyps fulvus

Famille : Accipitridae

Répartition:

Ce vautour se répartie sur la partie sud de l'Europe.

Habitat:

Le vautour fauve fréquente les paysages ouverts avec falaises et dénivelés importants.

Description:

Son crâne recouvert d'un duvet blanc est prolongé par un cou étroit et long d'où émerge une collerette de plumes hérissées blanches et duveteuses. Le bec puissant de couleur corne est pâle, les yeux jaunes. L'ensemble de la poitrine et du ventre fauve contraste harmonieusement avec le dos et le croupion chamois-brun. Les rémiges et les plumes de la queue courte et carrée adoptent une coloration brun-foncé noir. Le dessous est recouvert de stries brunes.



Fiche Espèce:

BONDRÉE APIVORE/EUROPEAN HONEY-BUZZARD

Pernis apivorus

Famille : Accipitridae

Répartition:

Ce rapace se rencontre sur toute l'Europe excepté l'Asie et aussi sur l'ensemble de l'Afrique.

Habitat:

Lors de la reproduction, la bondrée apivore occupe des terrains découverts et se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit le nid. Elle fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend également aux campagnes et aux friches peu occupées par l'homme.


Description:

La bondrée apivore mesure environ 60 cm pour une envergure d'environ 1,50 mètre. La femelle est plus grande que le mâle.

La couleur du plumage est variable, mais il est principalement brun-roux. La queue présente trois barres espacées et sombres. On peut voir les stries caractéristiques en travers du dessous des ailes, et elles vont du blanc au brun foncé. Les barres horizontales sur les rémiges et les caudales sont un bon critère d'identification de cette espèce.

La queue est relativement longue et mince. Les ailes sont longues et puissantes. La tête est plutôt petite et étroite. Le mâle a souvent la tête grisâtre et ses yeux sont dorés. Le bec est pointu et crochu, avec le bout noir.

Les cuisses sont emplumées. Les pattes et les serres puissantes sont jaunes, avec des doigts forts.



Comparaison juvénile/adulte



Fiche Espèce:

ROUSSEROLLE VERDEROLLE/MARSH WREN

Acrocephalus palustris

Famille : Acrocephalidae

Répartition:

La rousserolle verderolle s'étend principalement de l'est de la France à la Russie, au nord de la Suède et au sud de la Grèce et en Turquie.

Habitat:

Cette rousserolle fréquente la végétation épaisse formée d'orties et d'ombellifères, mais aussi les bosquets situés au bord de l'eau (rivières, marais...).

Description:

Cette espèce peut être confondue avec le rousserolle effarvate. Elles sont différenciables par leur chant, mais de façon générale les deux espèces ne fréquentent pas les mêmes habitats.

Cette rousserolle est également de teinte brune, mais elle est plus blanche sur les parties inférieures, et davantage vert-olive sur les parties supérieures. Elle a les pattes claires. Le bec est légèrement plus court. La calotte est plus ronde.



Fiche Espèce:

ALOUETTE DES CHAMPS/EURASIAN SKYLARK

Alauda arvensis

Famille : Alaudidae

Répartition:

L'alouette des champs vit en Europe de l'Ouest ainsi que sur la bande côtière de l'Afrique du nord et sur tout le pourtour de la mer noire.

Habitat:

Cette alouette se rencontre dans les campagnes ouvertes, les zones cultivées, les marais, les prairies et les dunes. Elle évite les zones boisées, mais on peut la trouver aux lisières des forêts et aussi à moyenne et haute altitude dans les zones ouvertes, de 1000 à 2700 mètres.

Description:

L'alouette des champs a les parties supérieures brunes, intensément striées de brun noirâtre. La calotte est légèrement plus foncée, contrastant avec le sourcil blanchâtre. Les parties inférieures sont blanches, excepté la poitrine chamois clair striée de brun foncé. La gorge est jaunâtre, finement striée de foncé. La queue est presque noire, avec les rectrices externes tachetées de blanc. Les ailes présentent des liserés clairs. La tête possède de longues plumes sur le sommet de la calotte, formant une crête qui se hérisse à certains moments. Les yeux sont brun foncé. Le bec est relativement court.



Fiche Espèce:

MARTINET NOIR/COMMON SWIFT

Apus apus

Famille : Apodidae

Répartition:

C'est une espèce migratrice qui, en été, a une aire de répartition couvrant une grande partie de l'Eurasie et qui rejoint en hiver un bon tiers de l'Afrique au sud de l'équateur.

Habitat:

Le martinet fréquente les villes, les villages et les ruines.

Description:

Le martinet noir est aisément reconnaissable à son plumage sombre et à ses longues ailes effilées tenues en arrière dans un profil en fer à cheval. Même dans son vol bas et rapide, ses ailes sont toujours tendues, jamais fléchies. En vol, il paraît avoir une tête courte et une queue relativement longue. Il a une queue fourchue souvent fermée. Le plumage de l'adulte est brun très foncé, presque noir à contre jour. Sous une bonne lumière, sa gorge se révèle claire.



Fiche Espèce:

GRIMPEREAU DES BOIS/EURASIAN TREECREEPER

Certhia familiaris

Famille : Certhiidae

Répartition:

Cette oiseau se rencontre dans toute l'Europe.

Habitat:

L'habitat privilégié de ce grimpereau est constitué par les vieilles futaies de feuillus, conifères ou mixtes de l'étage collinéen et montagnard : hêtraie, hêtraie-sapinière, pessière...

Description:

Cet oiseau est reconnaissable à son bec courbé qui lui serve à aller chercher les insectes dissimulés sous les écorces. Il se déplacer également à la verticale le long des troncs d'arbres. C'est un oiseau de petite taille, environ 12 cm pour une envergure de 17 à 21 cm. Son dos est brun maculé de chamois. La queue est rousse, le dessous blanc .



Fiche Espèce:

CINCLE PLONGEUR/WHITE THROATED DIPPER

Cinclus cinclus

Famille : Cinclidae

Répartition:

Cette oiseau se rencontre dans toute l'Europe.

Habitat:

Les cincles vivent sur les rives des cours d'eau rapides, dans les endroits rocaillieux et escarpés et prioritairement en altitude.

Description:

Chez cette espèce, les deux sexes sont semblables.

Le cingle plongeur est un oiseau à queue courte. La tête, la nuque et le haut du dos sont brun-roux. Le dos est gris-ardoise foncé, avec un aspect écaillé.

Le menton, la gorge et la poitrine sont d'un blanc pur, séparés de l'abdomen foncé par une bande couleur châtain.

Le bec est noirâtre. Les yeux sont foncés avec une paupière claire, et une membrane nictitante blanchâtre visible quand il cligne des yeux.



Fiche Espèce:

PIGEON RAMIER/COMMON WOOD PIGEON

Columba palumbus

Famille : Columbidae

Répartition:

Cette espèce est répartie sur l'ensemble de l'Europe, jusqu'en Afrique du nord.

Habitat:

Le pigeon ramier se nourrit dans les terres cultivées dégagées et les prairies. On peut aussi le rencontrer en lisière de forêt, dans les parcs et les jardins. Il est aussi de plus en plus visible en ville.

Description:

Cet oiseau mesure 45 cm de long pour une envergure d'environ 75 cm.

Les deux sexes sont semblables. Les oiseaux adultes ont un plumage bleu-gris, rosâtre sur la poitrine et une tache blanche sur le côté du cou.

Le bec est rougeâtre avec une extrémité jaune et les pattes sont roses.

Les jeunes sont plus ternes et n'ont pas de tache blanche sur le cou.



Fiche Espèce:

TOURTERELLE TURQUE/EURASIAN COLLARED DOVE

Streptopelia decaocto

Famille : Columbidae

Répartition:

Cette espèce possède une répartition eurasiatique. En France, elle se rencontre sur l'ensemble du pays, rarement au-dessus de 1500 mètres d'altitude.

Habitat:


Espèce dépendant des implantations humaine, cet oiseau se rencontre principalement dans les villes et les villages.

Description:

Le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Comme un bon nombre de tourterelles, elle est reconnaissable à son collier noir.

La tourterelle turque a le plumage gris-sable clair. Les parties supérieures sont gris clair chamoisé sur les ailes, le dos et la queue. Les parties inférieures sont légèrement chamois rosé clair sur la poitrine et l'abdomen.



Fiche Espèce:

GRAND CORBEAU/COMMON RAVEN

Corvus corax

Famille : Corvidae

Répartition:

Cette espèce est largement répartie, puisqu'elle possède l'aire de répartition la plus étendue des membres de son genre.

Habitat:

Le grand corbeau vit dans des habitats sauvages variés, depuis les falaises côtières jusqu'aux hautes montagnes. On le trouve aussi dans les zones boisées et les forêts ouvertes, même en terrain bas. Il niche principalement dans les zones de falaises.

Description:

Le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Le grand corbeau a un plumage brillant avec des plumes irisées bleu-violet. Il porte de longues plumes ébouriffées sur la gorge. Elles forment un arrondi, comme un éventail semi-circulaire.

Les ailes sont longues et pointues. Les primaires sont nettement séparées quand il plane. La queue est de forme carrée et souvent légèrement déployée. C'est un corbeau de taille importante. Il a un bec long, robuste et noir, légèrement recourbé. Son bec est plus vigoureux que celui des corneilles, et couvert de crins noirs à la base de la mandibule supérieure. Les yeux sont sombres, presque noirs. Les doigts et les pattes sont noirs.



Fiche Espèce:

GEAI DES CHÊNES/EURASIAN JAY

Garalus glandarius

Famille : Corvidae

Répartition:

En France, cette espèce est présente sur l'ensemble du pays.

Habitat:

Il fréquente les forêts, surtout les feuillus (chênes), également les bocages, les bois, les parcs et les jardins, y compris les villes.

Description:

Cet oiseau mesure 34 cm de long pour une envergure d'environ 52 cm.

Il est reconnaissable à son plumage coloré, rayé de noir et blanc sur la tête, dont les plumes peuvent se dresser (huppe érectile). Son bec est prolongé par une bande noire sous l'œil qui donne l'impression qu'il porte des sortes de moustaches noires.

Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus clair sur le dessous, sa queue est noire, son croupion et son bas-ventre blanc, ses rémiges primaires des ailes sont bleu vif et noir.



Fiche Espèce:

CASSE-NOIX MOUCHETÉ/SPOTTED NUTCRACKER

Nucifraga caryocatactes

Famille : Corvidae

Répartition:

En France, cette espèce est présente dans les Alpes.

Habitat:

Il fréquente les forêts de conifères de montagnes composées de pins cembro.

Description:

Cet oiseau mesure 34 cm de long pour une envergure d'environ 55 cm.

Il est reconnaissable à son plumage brun tacheté de blanc sur le dos et la face inférieure du corps. Le bec est robuste, la silhouette massive, la queue est noire avec l'extrémité blanche sur le dessus, entièrement blanche sur le dessous. Les ailes sont brun-noir.



Fiche Espèce:

CHOCARD A BEC JAUNE/ALPINE CHOUGH

Pyrrhocorax graculus

Famille : Corvidae

Répartition:

En France, cette espèce est présente dans les Alpes, les Pyrénées et la Corse.

Habitat:

Le chocard à bec jaune fréquente les milieux ouverts d'altitude, généralement à proximité des refuges et des stations de sports d'hiver. Il se rencontre également au abords des falaises d'altitude qu'il utilise pour nicher.

Description:

Cet oiseaux mesure 38 cm de long pour une envergure variant entre 70 et 85 cm.

Les chocards ont un bec jaune, court et fin, légèrement recourbé. Les pattes et les pieds sont rouges.

La queue est relativement longue, un peu arrondie à son extrémité. L'ensemble du plumage est noir, avec un lustre vert bleuâtre sur les ailes et sur la queue.



Fiche Espèce:

CRAVE A BEC ROUGE/RED-BILL CHOUGH

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Famille : Corvidae

Répartition:

En France, cette espèce est présente dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Elle se rencontre également sur les côtes bretonnes ou certains couples nichent.

Habitat:

Il se fréquente certaines falaises et pelouses littorales de Bretagne, mais se rencontre plus facilement en moyenne et haute montagne au abords des falaises et des alpages.

Description:

Cet oiseaux mesure 40 cm de long pour une envergure variant entre 68 et 80 cm.

Contrairement au chocard, il a un bec rouge recourbé et les pattes rouges.

Il présente un plumage bleu-noir avec des reflets verts sur les ailes.

En vol, il a les ailes clairement digitées.



Fiche Espèce:

COUCOU GRIS/COMMON CUCKOO

Culus canorus

Famille : Cuculidae

Répartition:

Le coucou gris est un migrateur largement répandu. Il se reproduit à la belle saison dans une aire qui comprend l'Europe, presque toute l'Asie et le nord du Maghreb. Ses quartiers d'hiver sont le sud de l'Afrique et l'Asie du sud-est.

Habitat:

Le coucou gris vit aux lisières des forêts et dans les clairières, les fermes, les marais, les dunes côtières et les campagnes ouvertes, les zones cultivées avec des arbres et des buissons, et près des roselières.

Description:

Cette espèce est principalement reconnaissable à son chant très caractéristique.

Le coucou est un oiseau discret, longiligne, de taille moyenne (environ 30 cm), avec de longues ailes pointues et une longue queue arrondie. En vol, il peut être confondu avec l'épervier d'Europe qui a des ailes pointues similaires.

Le coucou gris adulte mâle a les parties supérieures grises, ainsi que la tête, la gorge et la poitrine. Les parties inférieures sont blanches, finement barrées de noir. La tête est grise, les yeux sont brun avec un cercle oculaire jaune.

Il vole avec des battements d'ailes réguliers, les ailes n'étant que très peu soulevées au-dessus du corps. Le bec est alors tendu vers l'avant. Il perche souvent seul, sur les lignes et poteaux, les ailes tombant légèrement, alors que la queue est légèrement relevée.



Fiche Espèce:

BRUANT FOU/ROCK BUNTING

Emberiza cia

Famille : Emberizidae

Répartition:

En France, cet oiseau se rencontre dans les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central et les Cévennes.

Habitat:

Le bruant fou a une préférence pour les pentes ensoleillées et escarpées, les versants exposés des hautes vallées alpestres. Cet oiseau aime aussi les zones rocailleuses et les vignes.

Description:

Cet oiseau mesure de 16 cm de long.

Le bruant fou est un passereau au plumage brun. Gorge et poitrine sont finement tachetées, tête et cou gris bleuté ornés de bandes noires. La femelle est d'un brun plus terne.



Fiche Espèce:

BRUANT JAUNE/YELLOW HAMMER

Emberiza citrinella

Famille : Emberizidae

Répartition:

Cet oiseau se rencontre dans presque toute la France, excepté la Corse, la basse-vallée du Rhône, les Landes et une grande partie de l'Aquitaine.

Habitat:

Ce bruant occupe particulièrement les milieux ensoleillés avec alternance de cultures céréalières ou friches à graminées, et de buissons ou haies. A l'occasion, il s'observe dans les landes et les clairières forestières de feuillus et de conifères ou dans les jeunes plantations de pins.

Description:

Cet oiseau mesure de 17 cm de long.

Oiseau assez grand et allongé, avec une longue queue. Le mâle a la tête jaune, le dessous jaune-citron, le croupion roux, le manteau roux rayé et les flancs rayés. Le blanc de ses rectrices externes est très visible au vol. La femelle est beaucoup moins jaune, plus tachetée et rayée surtout à la tête.



Fiche Espèce:

FAUCON PÉLERIN/PEREGRIN FALCON

Falco peregrinus

Famille : Falconidae

Répartition:

En France, ce rapace est confiné aux escarpements rocheux des Alpes et aux falaises côtières le long de la Manche.

Habitat:

Le faucon pèlerin est un oiseau rupestre. Il utilise les falaises aussi bien comme point d'observation élevé pour la chasse que pour nicher. Ses plus fortes densités se trouvent donc dans les régions riches en proies potentielles et où les escarpements rocheux sont nombreux.

Description:

C'est un rapace court et massif.

La tête ronde, assez volumineuse par rapport au corps, paraît relativement plus petite chez la femelle que chez le mâle. Elle est noire chez l'adulte, brun plus ou moins sombre ou roussâtre chez les jeunes de moins de 1 an.

Les joues sont marquées d'une large tache noire en forme de "favoris". La moustache commune à toutes les variétés de faucons est particulièrement large chez le pèlerin. La tête est noire et les larges moustaches donnent l'impression que l'oiseau est casqué. Le bec est courbe, court et pourvu d'une denticulation à la mandibule supérieure qu'on observe chez tous les faucons.

Le plumage des deux sexes est sensiblement le même. Le dos est marron plutôt uniforme chez les jeunes, gris chez les adultes.



Fiche Espèce:

FAUCON CRÉCERELLE/COMMON KESTREL

Falco tinnuculus

Famille :Falconidae

Répartition:

Cette espèce est largement répartie sur toute l'Eurasie.

Habitat:

Le faucon crécerelle se rencontre dans les régions cultivées ou peu boisées, landes. Présent du bord de la mer jusqu'en montagne (2 500 m) pour peu qu'il trouve nourriture et lieu propice à la nidification.

Description:

Le bec du Faucon crécerelle est court et recourbé dès la base.

Le faucon crécerelle mâle a la tête, la nuque et les côtés du cou gris bleuté. La cire et le cercle oculaire sont jaune-citron. Comme les autres faucons, il a une moustache noire. Le bec est gris foncé. Les pattes et les doigts sont jaunes.

La femelle a la tête et la nuque châtain clair, rayées de brun foncé. La moustache est moins nette que chez le mâle. Elle est plus grande que le mâle. L'immature ressemble beaucoup à la femelle.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

VENTURON MONTAGNARD/CITRIL FINCH

Carduelis citrinella

Famille : Fringillidae

Répartition:

Cet oiseau peuple la France (Pyrénées, Alpes, Massif Central, Jura, Vosges), la Suisse, l'Allemagne (Forêt Noire), l'Autriche (Tyrol), l'Italie (Alpes, monts Apennins) et l'Espagne (Pyrénées, monts Cantabriques, montagnes du centre).

Habitat:

Le venturon montagnard fréquente les forêts de montagne à partir de 700 mètres d'altitude environ et jusqu'à la limite des arbres, souvent dans les sapinières à clairières proches des alpages. Il est assez commun à la lisière des forêts de conifères d'altitude, sur les pentes rocailleuses parsemées d'épicéas et de broussailles.

Description:

Cet oiseau a un aspect non strié.

Le mâle adulte présente un dessous jaune intense et un dessus vert jaunâtre avec des ailes noirâtres et des barres alaires jaunes bien évidentes. Le croupion est jaunâtre mais le caractère le plus remarquable est sans doute la tête et les côtés de la poitrine gris bleuté contrastant avec le menton et le front jaunâtre. Il ne possède de jaune ni aux ailes, ni à la base de la queue.



Comparaison mâle/femelle



Mâle

Fiche Espèce:

SIZERIN FLAMMÉ/COMMON REDPOLE

Carduelis flammea

Famille : Fringillidae

Répartition:

Il est réparti en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Habitat:

Il convoite particulièrement les forêts et bois composés d'aulnes et de bouleaux.

Description:

Le sizerin flammé a une calotte rouge très marquée et la poitrine carminée. Le dessus du corps est gris-brun, le dessous blanchâtre, les flancs et le derrière sont tachetées longitudinalement.

Il se différencie des autres espèces de la même famille grâce à son bec jaune paille taché de noir sur le dessous.



Fiche Espèce:

TARIN DES AULNES/EURASIAN SISCIN

Carduelis spinus

Famille : Fringillidae

Répartition:

Il est réparti dans toute l'Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Habitat:

Le tarin des aulnes habite dans les bois, forêts ou terrains vagues assez boisés avec une préférence pour les conifères. On le rencontre assez souvent pendant la période hivernale près des aulnes et les bouleaux sur lesquels il vient se nourrir.

Description:

Ce petit oiseau possède un plumage vert-jaune vif. Sa calotte et son menton sont noirs.

Son, sourcil, sa barre alaire, son croupion et les côtés de sa queue sont jaunes. Son ventre est plus clair et semble pouvoir être également strié de noir sur fond blanc.

La femelle est brun-gris entièrement striée dessous et dessus. Le dessus de la tête est jaune. Poitrine, ventre et sous-caudales sont blancs.



Mâle à gauche et femelle à droite

Fiche Espèce:

PINSON DES ARBRES/CHAFFINCH

Fringilla coelebs

Famille : Fringillidae

Répartition:

Cet oiseau est présent dans toute l'Europe, au Maghreb et dans la partie Nord de l'Asie.

Habitat:


Le pinson des arbres fréquente les forêts de feuillus et de conifères, dans les parcs, les grands jardins, les vergers et les haies.

Description:

Cet oiseau mesure de 18 cm de long.

Le pinson des arbres mâle adulte a les parties inférieures rosâtres avec le bas-ventre blanchâtre. Les parties supérieures comprennent le manteau brun-noisette, et le croupion verdâtre. Deux barres blanches sont visibles sur les ailes. La queue est gris ardoisé sur les plumes centrales, les autres sont noires avec des liserés blancs. La calotte et la nuque sont bleu-gris, les joues sont rosâtres et le front noir. Les pattes et les doigts sont bruns clair.

La femelle a une couleur plus uniforme, gris-brun sur les parties inférieures et brun-verdâtre sur les parties supérieure. Tout comme le mâle elle est reconnaissable à ses deux barres alaires blanches.



Comparaison mâle/femelle



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

BEC CROISÉ DES SAPINS/RED CROSSBILL

Loxia curvirostra

Famille : Fringillidae

Répartition:

Cet oiseau est présent dans toute l'Europe, mais également en Amérique du Nord jusqu'en Alaska.

Habitat:

Le bec-croisé des sapins se rencontre dans les forêts de conifères, pins et épicéas jusqu'à 3000 mètres d'altitude.

Description:

Cet oiseau mesure de 14 à 17 cm de long.

Le bec-croisé adulte mâle a le plumage rouge-brique. Les ailes sont brun grisâtre foncé. La queue fendue est brun noirâtre.

La tête est rouge terne, de couleur plus vive sur le front, et la calotte.

Comme son nom l'indique possède des mandibules croisées à leurs extrémités. Le bec est également épais et courbe. Les yeux sont bruns foncé, les pattes et les doigts sont noirs. La femelle adulte est jaune verdâtre terne, avec le croupion plus jaune.



Comparaison mâle/femelle



Mâle

Fiche Espèce:

LINOTTE MÉLODIEUSE/WHITE WINGED SNOW FINCH

Montifringilla nivalis

Famille :Fringillidae

Répartition:

Cet oiseau est présent en Europe occidentale en Asie et en Russie.

Habitat:


Cet espèce fréquente les zones ouvertes à végétation buissonnantes.

Description:

Cet oiseau mesure de 14 cm de long.

Le mâle est brun avec la poitrine et le front d'un rose intense.

La femelle est totalement brune excepté la queue et l'extrémité des ailes qui sont noirs.



Comparaison mâle/femelle



Femelle à gauche et mâle à droite

Fiche Espèce:

BOUVREUIL PIVOINE/EURASIAN BULL FINCH

Pyrrhula pyrrhula

Famille : Fringillidae

Répartition:

Il est réparti sur toute l'Eurasie.

Habitat:

Le bouvreuil pivoine vit dans les zones boisées, conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. On le trouve aussi dans les vergers, les parcs et les jardins.

Description:

Cet oiseau mesure 16 cm de long pour une envergure d'environ 28 cm.

Le bouvreuil pivoine est un oiseau trapu avec une grosse tête. Le mâle a le manteau gris. Le croupion est blanc, contrastant avec la queue noirâtre. Les ailes sont noirâtres avec une seule barre alaire claire. Les parties inférieures sont rouge-rose et le bas-ventre est blanc. La tête, la calotte, la nuque et le menton sont noirs. Les joues et la gorge sont rouge-rose. Les yeux sont noirs. Les pattes sont brun-rosâtre. La femelle a les parties inférieures et le manteau gris-brun, le manteau étant légèrement plus foncé que le dessous.



BOUVREUIL PONCEAU

Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

HIRONDELLE DE ROCHERS/EURASIAN CRAG MARTIN

Ptyonoprogne rubestris

Famille : Hirundinidae

Répartition:

Cette espèce est répartie sur l'ensemble de l'Europe, de l'Asie et au nord de l'Afrique.

Habitat:

L'hirondelle de rochers habite dans les falaises côtières et de montagne (parfois jusqu'à 2000 mètres d'altitude) de préférence exposées au soleil et abritées du vent et de la pluie.

Description:

Hirondelle assez trapue au dessus gris-brun et dessous pâle avec le menton blanchâtre sans bande pectorale. Sa gorge est tachetée de sombre. Sa queue, dépourvue de filets, est courte et carrée avec de fines taches blanches en son extrémité, visibles lorsqu'elle est en vol.



Fiche Espèce:

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR/RED-BACKED SHRIKE

Lanius collurio

Famille : Laniidae

Répartition:

Cette espèce est répartie sur l'ensemble de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.

Habitat:

Elle fréquente les milieux ouverts riches en buissons (surtout épineux) qu'elle utilise pour nicher. Elle s'observe également dans les zones herbeuses riches en insectes ainsi qu'en perchoirs naturels et artificiels, jusqu'à 2000 mètres d'altitude.

Description:

La pie-grièche écorcheur est un oiseau carnivore qui mesure 17 cm de long pour une envergure d'environ 25 cm.

La mâle de pie-grièche écorcheur est un très bel oiseau, avec la tête et le cou gris clair, le dessous du corps blanc rosé. Le dos est rouge brunâtre, un large bandeau noir traverse le front, au-dessus des yeux.

La femelle est d'un brun-roux au dessus, d'un blanc sale au dessous, avec des ondes plus sombres sur la poitrine et sur les flancs.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

PIPIT FARLOUSE/MEADOW PIPIT

Anthus pratensis

Famille : Motacillidae

Répartition:

Ce pipit vit en dans le nord de l'Europe et l'Asie.

Habitat:

Ce pipit fréquente les milieux frais, humides et dégagés, tels les zones marécageuses, les prés humides et les marais, jusqu'à plus de 1 000 m d'altitude. On peut néanmoins le voir dans les terrains cultivés, les friches, les talus herbeux et le long des côtes maritimes.

Description:

Les pipits sont de petits oiseaux terrestres bruns et rayés. Les deux sexes sont semblables.

Le pipit farlouse a le dessus du plumage sombre ; sa gorge et sa poitrine sont tachetées, le dessous est jaunâtre. Absence de sourcil prononcé par rapport aux autres pipits. Les pattes sont brunâtres chez l'adulte et roses chez les jeunes, il est à noter que sa griffe postérieure est plus longue que le doigt lui-même.



Fiche Espèce:

PIPIT DES ARBRES/TREES PIPIT

Anthus trivialis

Famille : Motacillidae

Répartition:

En France, c'est un oiseau commun, excepté dans le Midi où il est absent.

Habitat:

Cet oiseau fréquente les bois ouverts. Il affectionne également les landes sèches, les prairies bocagères et s'accommode des lisières des bois et des talus herbeux.

Description:

Petit oiseau marron présentant des motifs striés.

Il peut être confondu avec le pipit farlouse, mais il se différencie de ce dernier par ses marques moins nombreuses sur le dessous. Son dos est brunâtre (le pipit farlouse est plus verdâtre) et son poitrail roux clair. Sa livrée est totalement striée, mais ces marques ne sont pas aussi évidentes que chez le pipit farlouse.

Il est souvent observé sur une branche proéminente ou au sommet d'un arbre. Il possède également un bec plus robuste à base rosâtre. La griffe du doigt arrière est courte et crochue lui permettant de se percher.



Fiche Espèce:

BERGERONNETTE GRISE/WHITE WAGTAIL

Motacilla alba

Famille : Motacillidae

Répartition:

En France, c'est un oiseau commun et largement réparti.

Habitat:

La bergeronnette se rencontre fréquemment au bord de l'eau, mais elle fréquente également les zones ouvertes et dégagées à végétation basse.

Description:

La taille de cet oiseau est d'environ 18 cm pour une envergure de 31 cm.

Cet oiseau est reconnaissable à sa démarche rapide en hochant la tête et la queue.

La bergeronnette grise est un oiseau bien connu, remarquable par ses contrastes de noir et blanc.

Chez le mâle, le dessus de la tête, la nuque, le menton, la gorge, le jabot ainsi que la queue sont noirs. Le manteau est gris et tout le reste est blanc ou gris.

Chez la femelle, une partie de ce qui est noir chez le mâle est gris foncé.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

ROUGE-GORGE FAMILIER/ROBIN

Erithacus rubecula

Famille : Muscicapidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Le rougegorge fréquente les terrains boisés, le bocage, les taillis, les forêts, les parcs et les jardins aussi bien dans les régions les plus isolées que dans les villes.

Description:

Le rougegorge familier est aisément reconnaissable avec sa poitrine et la face rouge orangé, contrastant avec les parties inférieures blanchâtres. Les parties supérieures son brun-vert-olive, ainsi que les ailes et la queue.

Le bec est conique, brun foncé avec la base claire.



Fiche Espèce:

MONTICOLE DE ROCHE/RUFUS TAILED ROCK THRUSH

Monticola saxabilis

Famille : Muscicapidae

Répartition:

C'est une espèce migratrice qui se répartie sur l'Europe du sud et de l'est.

Habitat:

Ses habitats privilégiés sont : les zones rocheuses ensoleillées (éboulis, secteurs rocailloux, ruines) et les pelouses alpines parsemées de rochers, de l'étage alpin à subalpin.

Description:

Le mâle de monticole de roche est inconfondable : dessus bleu avec un "mouchoir" blanc sur le dos (entre le manteau et le croupion), ailes brunes avec des liserés chamois, dessous et queue orange. La queue est relativement courte. La femelle a les caractéristiques suivantes : ailes brunes à liserés chamois, reste du corps brun moucheté et queue orange.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

GOBEMOUCHE GRIS/SPOTTED FLYCATCHER

Muscicapa straiate

Famille : Muscicapidae

Répartition:

Le gobemouche gris se rencontre dans toute l'Europe.

Habitat:

Ce gobemouche fréquente les jardins, les parcs et les bois clairs. Il apprécie également les petites clairières et les trouées au milieu de hauts feuillus.

Description:

Cet oiseau mesure 15 cm pour une envergure d'environ 25 cm.

Le dessus est brun-gris, strié sur la tête. Le dessous est blanc grisâtre. La poitrine est finement rayée. De loin, il semble tout gris. Il a un bec proéminent et pointu.



Fiche Espèce:

TRAQUET MOTTEUX/NORTHERN WHISTLER

Oenanthe oenanthe

Famille : Muscicapidae

Répartition:

C'est une espèce que l'on retrouve en Europe, Asie, Afrique du Nord, Amérique du Nord et même au Groenland.

Habitat:

Quoique le traquet motteux soit plutôt un habitant typique de la montagne, on le rencontre également souvent à de plus basses altitudes, dans les champs sablonneux et pierreux, les friches et jachères ensoleillées, les sablières et briqueteries, les talus de chemin de fer ou de chaussée et sur toute surface envahie d'herbes folles.

Description:

Dans son plumage nuptial, chez le mâle, le noir des ailes contraste avec le dos gris. Noirs également sont l'extrémité de la queue et un très net masque sur les yeux. Le croupion est blanc.

La femelle a le même coloris, mais moins contrasté. Chez elle, le noir est remplacé par du brun ou du gris foncé. Les jeunes se différencient des femelles par des taches sur le dos et sur la poitrine.

En vol, il est facile à reconnaître grâce à son croupion blanc et aux rectrices terminées par un T noir inversé.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

TARIER DES PRÈS/EUROPEAN STONECHAT

Saxicola rubetra

Famille : Muscicapidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre en Europe du nord et sur l'ensemble de l'Afrique.

Habitat:

Le tarier des prés est l'hôte caractéristique des prairies à foin ou à litière exploitées de manière peu intensive, des marais exondés et des pâturages.

Description:

Mesurant environ 14 cm, il se distingue par son sourcil blanc bien marqué.

Le croupion est brun jaunâtre tacheté de foncé. Il y a un peu de blanc à la base de la queue, visible en vol. Le mâle a le côté de la tête brun noirâtre encadré de blanc. La poitrine et la gorge sont ocre orangé. Il y a une ou deux taches alaires blanches. La femelle et les jeunes ont un sourcil blanc beigeâtre, les côtés de la tête brun clair, et ils n'ont normalement pas de taches alaires.

Il est souvent perché au sommet des plantes de grande taille.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

MÉSANGE BLEUE/EUROPEAN BLUE TIT

Cyanistes caeruleus

Famille : Paridae

Répartition:

La mésange bleue est sédentaire dans son habitat. Elle vit en Europe, au Moyen-Orient et dans le nord-est de l'Afrique.

Habitat:

La mésange bleue est présente dans presque tous les habitats dans les régions de feuillus, bois et jardins compris. Par contre, elle est absente dans les forêts pures de conifères. On peut la trouver en montagne jusqu'à 1200 mètres d'altitude.

Description:

Elle mesure environ 12 cm de long.

Elle se distingue par sa large calotte bleue. Une ligne bleue foncée traverse sa face blanche du bec à la nuque. Ses ailes et sa queue sont bleues. Le reste du dessus est brun verdâtre. Le dessous est jaune uniforme avec une bande médiane grise longitudinale peu marquée. Les deux sexes diffèrent uniquement par les couleurs moins vives et les dessins moins marqués

Ses yeux sont noirs et les pattes sont bleues.



Fiche Espèce:

MÉSANGE HUPPÉE/CRESTED TIT

Lophophanes cristatus

Famille : Paridae

Répartition:

Cette espèce peuple presque toute l'Europe, l'Asie et l'Afrique du nord.

Habitat:

Cette mésange se rencontre aussi bien en plaine qu'en altitude où elle fréquente les forêts étendues de conifères. Elle s'observe parfois dans les parcs et les jardins riches en vieux arbres.

Description:

Elle mesure environ 11 cm de long.

Son plumage présente une huppe noire très prononcée sur la tête, un bandeau oculaire noir en forme de croissant de chaque côté de celle-ci, une bavette et un collier noirs, un corps brun roux dessus et blanc crème dessous.



Fiche Espèce:

MÉSANGE CHARBONNIÈRE/GREAT TIT

Parus major

Famille : Paridae

Répartition:

La mésange charbonnière est présente partout en Europe, en Afrique du Nord et dans la majeure partie de l'Asie.

Habitat:

Elle fréquente tous types de boisements, y compris ceux de conifères purs. Elle se rencontre également dans les parcs, les jardins et même en ville.

Description:

C'est l'une des plus grande mésange avec environ 14 cm de long pour une envergure allant de 23 à 26 cm.

La mésange charbonnière a les parties inférieures jaunes avec une bande centrale noire partant du menton jusqu'à l'abdomen. Sur les parties supérieures, le dos est verdâtre. Les ailes sont bleu grisâtre avec une barre alaire blanche. La queue est bleu-gris avec les rectrices externes blanches. La tête est bleu-noir luisant avec les joues blanches. Les yeux sont noirs. Le bec court est noirâtre. Les pattes et les doigts sont bleu-gris clair. La femelle se différencie du mâle par sa bande noire plus étroite sur la partie inférieure.



Fiche Espèce:

MÉSANGE NOIRE/COAL TIT

Pariparus ater

Famille : Paridae

Répartition:

La mésange noire vit en Europe dans les Alpes et en Italie, et des Balkans à la Grèce. En France on la trouve dans les sept départements alpins (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes).

Habitat:

La mésange noire est typiquement un habitant des forêts de résineux, sapinières, pinèdes et bois d'épicéas.

Description:

Cette espèce peut être confondue avec la mésange charbonnière.

Contrairement à cette dernière, elle est dépourvue de couleurs vives et sa tête noir grisâtre n'est éclairée que par la tache occipitale blanche et les dessins de même couleur sur les joues. Le dessous blanc-gris contraste faiblement avec le dos gris bleuté. Les deux bandes blanches sur les ailes sont plus prononcées que chez les autres mésanges et facilitent l'identification de cette espèce même à distance.



Fiche Espèce:

MÉSANGE NONNETTE/MARSH TIT

Poecile palustris

Famille : Paridae

Répartition:

La mésange nonnette vit en Europe.

Habitat:

Les mésanges nonnettes nichent en priorité dans les forêts de feuillus, en général des chênes ou des hêtres, lorsque leur superficie est suffisamment étendue. Elle fréquente également les forêts mixtes et les zones boisées le long des cours d'eau.

Description:

Cette mésange mesure environ 12 cm de long.

Le mâle et la femelle sont identiques, de couleur assez terne. Le dessus est gris-brun, le dessous blanc sale. La calotte noir brillant, les joues grises et une petite goutte noire sous le menton constituent sans doute les traits caractéristiques les plus remarquables.



Fiche Espèce:

MOINEAU CISALPIN/HOUSE SPARROW

Passer domesticus italiae

Famille : Passeridae

Répartition:

Cette espèce est présente dans le sud-est de la France, en Suisse, en Italie, dans le sud de la Slovénie, en Crête et en Algérie.

Habitat:

Ce moineau est étroitement associé aux habitations humaines et aux cultures agricoles.

Description:

Cette espèce résulte de l'hybridation entre le moineau domestique et le moineau espagnol. C'est un petit oiseau assez trapu, mesurant environ 16 cm de long.

Le mâle de cet oiseau se distingue de celui du Moineau domestique type par la calotte et la nuque marron roux vif sans trace de gris au centre.

La femelle a un plumage identique à celle du moineau domestique. Elles sont pâles, colorées de brun et de gris.



Mâle



Femelle

Fiche Espèce:

PERDRIX BARTAVELLE/ROCK PARTRIDGE

Alectoris graeca

Famille : Phasianidae

Répartition:

La perdrix bartavelle vit en Europe dans les Alpes et en Italie, et des Balkans à la Grèce. En France on la trouve dans les sept départements alpins (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes).

Habitat:

La perdrix bartavelle peut se rencontrer aussi bien dans des zones à garrigues que dans les divers milieux montagnards s'étalant des alpages aux crêtes sommitales, entre 1500 et 2600 mètres d'altitude.

Description:

La perdrix bartavelle a le dos gris cendré brunâtre, le haut de la poitrine gris bleuté, le ventre roux pâle et les flancs rayés de roux, de noir et de crème. Le bec et les pattes sont rouges.



Fiche Espèce:

LAGOPÈDE ALPIN/ROCK PTARMIGAN

Lagopus mutus

Famille : Phasianidea

Répartition:

En France, on le retrouve en haute montagne dans les Alpes et les Pyrénées.

Habitat:

Au printemps et en automne, les lagopèdes choisissent des paysages ouverts avec végétation clairsemée, les mâles optant pour des territoires avec affleurements rocheux offrant des perspectives qui leur permettent d'exercer une surveillance sur les femelles et le reste de la bande

L'habitat d'hiver est constitué par les pentes broussailleuses proches de la limite des arbres, à des endroits où la végétation est apparente sous la neige.

Description:

Les lagopèdes ont l'allure générale de petits tétras ou de faisans. Contrairement à la plupart des oiseaux qui n'en ont que deux, les lagopèdes revêtent trois plumages au cours de l'année.

En hiver, leur plumage est blanc pur, excepté la queue noire qui est présente chez les deux sexes pendant toute l'année. Les pattes sont fortement plumées et font office de raquettes, ce qui leur facilite la marche dans la neige molle. En été, les deux sexes sont barrés de taches brunes et noires indéfinissables sur le dessus. L'abdomen et le bord extérieur des ailes sont blanchâtres. Les femelles sont plus grossièrement marquées que les mâles.



Plumage d'été



Plumage d'hiver

Fiche Espèce:

TÉTRAS LYRE/BLACK GROUSE

Lyrurus tetrix

Famille : Phasianidae

Répartition:

Le tétras lyre vit en Grande-Bretagne et dans le nord et l'est de l'Europe. Au sud de l'Europe, on le trouve surtout dans les Alpes et les Carpates. Enfin, il peuple la Sibérie jusqu'à l'océan Pacifique.

Habitat:


En montagne, il fréquente les forêts de conifères avec clairières et tourbières, à la limite supérieure des arbres (c'est la zone des rhododendrons et des aulnes verts). On le rencontre jusqu'à 2300 mètres d'altitude dans les Alpes.

Description:

Cet oiseau mesure 60 cm de long pour une envergure variant entre 65 et 80 cm.

Le tétras lyre mâle possède un plumage noir à reflets bleus. Ses ailes sont brun-noir avec une petite barre blanche. Le dessous des ailes et de la queue est blanc. La queue se termine en forme de lyre. Le dessus de l'œil, est rouge, de taille variable. Le bec est court. Les pattes sont courtes et emplumées.

La femelle porte un plumage brun-roussâtre barré de noir. La queue est à peine fourchue.



Comparaison femelle/mâle



Mâle

Fiche Espèce:

POUILLOT VÉLOCE/EURASIAN CHIFFCHAFT

Phylloscopus collybita

Famille : Phylloscopidae

Répartition:

Le pouillot véloce est réparti en Europe et en Asie.

Habitat:

Il fréquente les zones ouvertes mais aussi les parcs, les jardins et les cimetières.

Description:

Petit oiseau de 12 cm de long, à pattes et à bec fin.

La queue, étroite et courte, est coupée droit. Il est presque uniformément gris verdâtre dessus et blanc ou blanc jaunâtre dessous. Il a les pattes assez sombres.

Il a un sourcil pâle peu apparent.



Fiche Espèce:

POUILLOT SIFFLEUR/WOOD WARBLER

Phylloscopus sibilatrix

Famille : Phylloscopidae

Répartition:

Il est présente dans toute l'Europe et en Afrique du nord.

Habitat:

Cet oiseau vit dans les collines de vieux chênes, les forêts de grands hêtres, les sous-bois dégagés constitués de sols couverts d'un humus de feuilles mortes

Description:

C'est le plus grand de tous les pouillots avec 12 cm de long pour environ 24 cm d'envergure.

Le mâle et la femelle sont identiques.

Le dessus du corps est jaune-verdâtre, les pattes sont claires.

Il se distingue des autres pouillots par son sourcil jaune éclatant, la bande vert foncé qui lui barre l'œil, les joues et la gorge jaunes qui contrastent avec le dessous blanc soyeux.



Fiche Espèce:

ACCENTEUR ALPIN/ALPINE ACCENTOR

Prunella collaris

Famille : Prunellidea

Répartition:

Cet oiseau a une répartition eurasiatique.

Habitat:

L'accenteur alpin est typiquement un oiseau de montagne. Il niche plus haut que la limite des forêts, le plus souvent dans les sommets, les pentes rocheuses ou dans les ravins avec végétation éparse entre 1800 et 4000 mètres.

Description:

Le mâle et la femelle ont les même coloris.

Plus grand et plus coloré que l'accenteur mouchet, l'accenteur alpin mesure 18 cm pour une envergure égale. Ce petit oiseau est gris aux flancs striés de roux. Le ventre est gris-brun avec des taches rousses sur les flancs. La tête, le cou et la partie avant de la poitrine sont gris. Le signe distinctif le plus lisible est fourni par la tache blanche de la gorge, nettement délimitée et persillée de traits noirs.



Fiche Espèce:

ACCENTEUR MOUCHET/HEDGE ACCENTOR

Prunella modularis

Famille : Prunellidae

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Europe.

Habitat:

Il fréquente les boisements de conifères, les forêts mixtes et de feuillus avec clairières, coupes et fourrés épais. Il s'installe également dans les jeunes plantations d'épicéas, dans les parcs, les jardins, les cimetières, les haies et les broussailles touffues.

Description:

Cet oiseau mesure 14 cm de long pour une envergure de 21 cm.

L'accenteur mouchet présente une tête gris bleuté avec le reste du corps gris brunâtre. L'ensemble du plumage donne l'impression d'être uniformément coloré et assez sombre. Les pattes sont brun-rouge et la queue ne porte pas de marques blanches.

Les grandes ailes sont marquées de fines taches pâles qui forment parfois comme une étroite barre alaire.



Fiche Espèce:

ROITELET HUPPÉ/GOLDCREST

Regulus regulus

Famille : Regulidae

Répartition:

Le roitelet huppé a une répartition eurasiatique.

Habitat:

Le roitelet huppé se reproduit dans les forêts de conifères et mixtes, dans les grands jardins et les parcs avec des conifères. En dehors de la saison de reproduction, il fréquente les broussailles et les feuillus.

Description:

Le roitelet huppé est l'un des plus petits oiseaux d'Europe avec 9 cm de long.

Les parties supérieures sont vert-olive. Les ailes larges et arrondies présentent deux barres blanches, et des rémiges foncées. Les parties inférieures sont blanc chamoisé.

Il a la face claire avec la calotte orange chez le mâle, et jaune chez la femelle, bordées de noir chez les deux sexes. Ces plumes forment une courte crête quand l'oiseau est excité ou inquiet.

Le bec est noir et pointu et les pattes sont brun-clair.



Fiche Espèce:

CHEVALIER GUIGNETTE/COMMON SANDPIPER

Actitis hypoleucos

Famille : Scolopacidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Cet oiseau fréquente les berges et les étangs des cours d'eau, avec une préférence pour les bancs de galets.

Description:

Le plumage du chevalier guignette est brun-gris barré de brun foncé sur le dessus qui contraste particulièrement avec le dessous blanc cassé.

Il est facilement reconnaissable grâce à ses grandes pattes gris-verdâtre. Son bec est long et rectiligne, outil indispensable pour sonder la vase en quête de nourriture.

En vol, il est reconnaissable à la bande blanche qui traverse les ailes ainsi que son croupion sombre.



Fiche Espèce:

SITTELE TORCHEPOT/EURASIAN NUTHATCH

Sitta europaea

Famille : Sittidae

Répartition:

La sittelle torcheopot se rencontre dans toute l'Europe.

Habitat:

La sittelle torcheopot affectionne les bois de feuillus, les bois mixtes et de résineux. Mais on la rencontre aussi en abondance dans les parcs et les grands jardins.

Description:

Cet oiseau mesure 14 cm de long.

La sittelle torcheopot est un oiseau trapu. Elle a les parties supérieures bleu-gris, et une queue courte. Les parties inférieures, menton et cou, sont blanches, devenant orangées sur le haut de la poitrine, les flancs, l'abdomen et les sous-caudales.

Les ailes sont courtes et arrondies.

La tête bleu-gris est assez grosse, avec une ligne noire traversant l'œil. Les joues sont blanches, ainsi que le menton et le devant du cou.

Le bec bleu-gris est long et pointu. Les yeux sont noirs. Les pattes et les doigts aux longues griffes noires sont brun orangé clair.



Fiche Espèce:

HIBOU GRAND-DUC/EURASIAN EAGLE-OWL

Bubo bubo

Famille : Strigidae

Répartition:

Cet oiseau a une répartition eurasiatique.

Habitat:

Habite généralement aux abords de falaises et escarpements rocheux, dans des zones de montagne, mais parfois aussi dans des boisements moins élevées avec versants abrupts et en terrains steppiques.

Description:

C'est l'oiseau de proie nocturne le plus grand avec une longueur de 75 cm pour une envergure de pouvant atteindre 1,80 mètre.

Il est reconnaissable à ses yeux orange à rouge et à ses grandes aigrettes. Son plumage est brun-noirâtre à chamois.



Fiche Espèce:

CHOUETTE DE TENGMALM/BOREAL OWL

Aegolius funereus

Famille : Strigidae

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Europe et l'Amérique du nord.

Habitat:


Cet oiseau affectionne particulièrement les forêts d'épicéas. Elle est aussi commune dans les boisements mixtes de pins, de bouleaux et de peupliers où les conifères sont dominants.

Description:

C'est une petite chouette à grande tête.

Elle mesure entre 21 et 28 cm de long pour une envergure pouvant atteindre 58 cm.

La calotte brun foncé est marquée d'une multitude de petites taches d'intensité variable et soulignée par un V blanc placé entre les yeux. Les disques faciaux sont blancs. Les iris jaunes cerclés de noir lui donnent une expression étonnée très caractéristique. Le dessous beige roussâtre, plus ou moins barré est plus clair sur le ventre que sur la poitrine. Le dessus du corps est et recouvert de taches blanches.



Fiche Espèce:

CHEVÊCHETTE D'EUROPE/EURASIAN PYGMY OWL

Glaucidium passerinum

Famille : Strigidae

Répartition:

En France, cet oiseau se rencontre dans les Vosges, le Jura et les Alpes.

Habitat:

Cet oiseau se rencontre au -dessus de 1000 mètres d'altitude, dans les vieilles forêts de conifères peu ou pas exploitées, mêlées de feuillus et entrecoupées de clairières,

Description:

C'est la plus petite chouette d'Europe avec 17 cm de long pour environ 36 cm d'envergure. Elle est reconnaissable à ses grands yeux à iris jaune. Son bec est également jaunâtre.

Son plumage a une coloration principalement noir chamoisé à brun grisâtre, avec de tous les côtés des taches blanchâtres, et le dessous rayé brun sur fond blanc. Les côtés de la poitrine sont mouchetés de brun. Elle porte un important demi collier blanc à la base du cou. La queue est marron à gris brun, avec cinq rayures étroites blanchâtres.

Le disque facial n'est pas bien défini. La face est blanchâtre, avec de petites marques brunes ayant plutôt la forme de deux ou trois cercles concentriques incomplets autour de ses yeux.



Fiche Espèce:

CHOUETTE HULOTTE/TAWNY OWL

Strix aluco

Famille : Strigidae

Répartition:

Cette chouette est la plus répandue d'Europe. On la retrouve partout en France, excepté en Corse.

Habitat:

Cette chouette fréquente les bois, forêt et jardin parfois très proche des habitations voir même dans les maisons.

Description:

C'est la plus connue des rapaces nocturnes. Son corps trapu est tacheté avec des couleurs pouvant varier du gris au brun roux. Elle possède une grosse tête arrondie avec en son centre deux grands yeux noirs séparés par un triangle dont la base part du haut du crâne pour rejoindre le bec.



Fiche Espèce:

TICHODROME ÉCHELETTE/WALLCREEPER

Tichodroma muraria

Famille : Tichodromidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Le tichodrome est un habitant des gorges, des falaises et des parois escarpées en montagne entre 400 et 2500 m d'altitude. En hiver, il peut être observé à des altitudes plus faibles sur de vieux édifices ou des rochers dans les plaines.

Description:

C'est le seul représentant de la famille.

Il mesure 17 cm.

Les deux sexes sont identiques.

C'est un petit oiseau montagnard aux larges ailes arrondies avec de grandes taches rouge-carmin et de gros points blancs. Dessus gris. Menton, gorge et poitrine noirs en été et blanchâtres en hiver. Long bec fin et légèrement courbe. Queue gris-noir tachetée de blanc.



Fiche Espèce:

TROGLODYTE MIGNON/WINTER WREN

Troglodytes troglodytes

Famille : Trochlodytidae

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie et de l'Amérique du nord.

Habitat:

Cet oiseau fréquente tout type d'habitats composés de rocailles et de branchage.

Description:

Le troglodyte mignon mesure 10 cm pour une envergure pouvant atteindre 17 cm. Son plumage brun avec le dessous clair. Il possède un bec fin et une queue relevée. Il est reconnaissable à son sourcil blanc bien marqué.



Fiche Espèce:

MERLE NOIR/EURASIAN BLACK-BIRD

Turdus merula

Famille : Turdidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie.


Habitat:

Le merle noir vit dans toutes sortes de forêts et de zones boisées avec des sous-bois, aux lisières des forêts, dans les zones arbustives, les cultures, les haies, les parcs et les jardins, et aussi dans les zones urbaines.

Description:

Cet oiseau mesure 27 cm pour une envergure de 37 cm.

Le merle noir adulte mâle a le plumage entièrement noir de jais, avec le cercle oculaire et le bec jaune orangé contrastant avec la couleur noir uni. Les yeux, les pattes et les doigts sont noirs. La femelle est plus brune que le mâle, avec la gorge et la poitrine brun clair. Son bec varie du brun au jaune-orangé.



Comparaison femelle/mâle



Mâle

Fiche Espèce:

GRIVE MUSICIENNE/SONG THRUSH

Turdus philomelos

Famille : Turdidea

Répartition:

Elle est répartie sur l'ensemble de la France et sur la quasi-totalité de l'Europe.

Habitat:

La grive musicienne vit dans une large variété d'habitats boisés avec des sous-bois épais, dans les forêts, les parcs, les jardins et dans les haies.

Description:

La grive musicienne est un oiseau trapu de 23 cm. Les parties supérieures et la tête sont brunes. Les parties inférieures sont blanchâtres, avec une couleur chamoisée et des taches brun foncé en forme de V sur la poitrine et les flancs. L'abdomen et le bas-ventre sont blancs. La queue brune est plutôt courte.

La tête est de couleur brune. Le bec est brun. Les yeux relativement grands sont brun foncé. Les pattes et les doigts sont rose pâle.



Fiche Espèce:

GRIVE LITORNE/FIELD FARE

Turdus pilaris

Famille : Turdidea

Répartition:

La grive litorne est un oiseau migrateur qui vit uniquement sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Les grives litornes nichent dans les zones boisées et à la lisière des forêts de bouleaux, de pins, d'épicéas, d'aulnes et d'un mélange d'autres essences. Ces habitats sont souvent situés à l'intérieur de zones humides, à proximité de prairies, de vallées baignées par un cours d'eau, d'une tourbière ou d'un marécage.

Description:

Elle mesure 28 cm pour une envergure de 42 cm. Elle se différencie des autres grives par ses couleurs plus vives.

Les deux sexes sont identiques.

Le meilleur signe distinctif est le gris ardoise de la tête, de la partie arrière de son cou et du croupion, qui contraste avec le brun du dos et le noir de la queue. Les parties inférieures sont blanchâtres fortement lavées de jaune-orange sur la poitrine et marquées de stries et de festons noirâtres qui s'estompent souvent en taches noires sur les côtés de la poitrine. Le dessous des ailes est blanc comme chez la grive draine. Le bec est jaune et les pattes sont brunes.



Fiche Espèce:

MERLE A PLASTRON/RING OUZEL

Turdus torquatus

Famille : Turdidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Europe.


Habitat:

Le merle à plastron fréquente des milieux ouverts avec arbustes du type tourbière, lande... Dans nos montagnes, ce merle vit généralement dans la végétation arbustive de l'étage subalpin (zone de transition entre les forêts du montagnard et les landes de l'alpin).

Description:

Il est facilement identifiable.

Son plumage est identique à celui du merle mis à part une grosse bavette blanche sur la poitrine. La femelle a des couleurs moins nuancées que le mâle.



Comparaison femelle/mâle



Mâle

Fiche Espèce:

GRIVE DRAINE/MISTLE THRUSH

Turdus viscivorus

Famille : Turdidea

Répartition:

Cet oiseau se rencontre sur l'ensemble de l'Eurasie.

Habitat:

Cet oiseau fréquente les milieux ouverts à proximité d'arbres pour nicher.

Description:

C'est une grosse grive de 28 cm pour une envergure de 42 cm environ.

Les deux sexes sont identiques.

Elle se distingue de la grive musicienne par ses parties supérieures (tête, dos et dessus de la queue) plus grises.

Les couvertures sous- alaires sont d'un blanc brillant. Les plumes à l'extérieur de la queue sont blanc-terne et ordonnées de façon variable. Enfin, les pattes sont jaunâtres.

